

WIĘCEJ SPRAWNOŚCI DLA PSICH STAWÓW

NOWOŚĆ

Wyjątkowe
połączenie

UCII® +
*Boswellia
serrata**

*Kadzidłowiec indyjski

NOWOŚĆ
Flexadin® Advanced



Flexadin Advanced

Wyzwanie dla standardowych rozwiązań - nowe połączenie dla sprawniejszego działania w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Flexadin Advanced — więcej dla wsparcia funkcji chrząstki stawowej

Flexadine Advanced dzięki swojemu unikalnemu składowi bardziej wspomaga metabolizm chrząstki stawowej w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów.



Wyjątkowe połączenie w celu wsparcia sprawności psich stawów poprzez działanie:

UCII®: regulacja odpowiedzi immunologicznej w przebiegu procesu zapalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów
- **doustne odczulane w mechanizmie immunomodulacji**



Boswellia serrata: efekty działania już po 2 tygodniach stosowania¹⁴



Zwiększenie sprawności ruchowej psów poprzez poprawę funkcjonowania ich stawów



Flexadin Advanced

Innowacyjne rozwiązanie dla jeszcze lepszego działania
w chorobie zwyrodnieniowej stawów

**Wyjątkowe połączenie dla lepszego działania w chorobie zwyrodnieniowej to:
UCII® + *Boswellia serrata***

**UCII® - Niezdenaturowany kolagen typu II - jest opracowanym
i zbadanym składnikiem o potwierdzonych właściwościach⁴.**

- **Całkowicie odmienny sposób działania** w porównaniu do dotychczasowo stosowanych preparatów chondroityny czy glukozaminy
- **Naśladuje naturalne mechanizmy obronne organizmu**
Działa w procesie zwanym "doustną tolerancją" aby wspomagać chrząstkę stawową w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów³
- **UCII® zyskuje na popularności** dzięki korzystnemu działaniu wykazanemu w wielu badaniach przeprowadzonych u ludzi, psów i koni^{4,5,6,7,8,9,10}

**Wyciąg z *Boswellia serrata* jest wyciągiem standaryzowanym,
co pozwala na zachowanie naturalnych właściwości rośliny:**

- stosowanie go wpisuje się w obecne tendencje sięgania po naturalne rozwiązania¹
- umożliwia uzyskanie efektów nawet w czasie 2 tygodni stosowania¹⁴



Flexadin Advanced

Wsparcie właścicieli zwierząt w codziennej opiece nad psem cierpiącym na chorobę zwyrodnieniową stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem o przebiegu przewlekłym. Dla powodzenia postępowania i jego wyników bardzo ważne jest zaangażowanie właściciela i komfort codziennego podawania preparatu.

Flexadin Advanced jako kompletne rozwiązanie oferuje:

Wyjątkową wygodę i łatwość podawania:

- 1 kąsek na dzień niezależnie od masy ciała psa
- Podawany może być jako nagroda w trakcie zabawy lub procesu rehabilitacji ruchowej
- Kąsek jest wysoce smakowity - 95% psów przyjmuje go spontanicznie¹³
- Flexadin Advanced cechuje doskonały profil bezpieczeństwa i brak przeciwwskazań
- Wygodne opakowanie w formie torebki strunowej



Flexadin Advanced: dzięki innowacyjności i wyjątkowości wzmacnia lojalność właścicieli zwierząt do lecznicy weterynaryjnej

Flexadin Advanced – rozwiązanie dla każdego psa

Flexadin Advanced to 2 wielkości opakowań:

opakowanie 30 kąsków - 1 miesiąc podawania

opakowanie 60 kąsków - 2 miesiące podawania



Program Mobilne Stawy

Wielokierunkowe rozwiązania dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego potrzeb

Program Mobilne Stawy oferuje wielokierunkowe i kompletne wsparcie lekarza weterynarii i właściciela zwierzęcia w zakresie preparatów leczniczych, chondroprotekcji i dostępnej wiedzy:

Chondro-
protekcja

Chondroprotekcja:

Flexadin Advanced wspomaga chrząstkę stawową chorobie zwyrodnieniowej stawów



Edukacja
właściciela

Edukacja właściciela:

Zwiększenie świadomości właścicieli na temat choroby zwyrodnieniowej stawów i jej przebiegu



My Happy Pet
by vetoquinol



NLPZ

NLPZ:

Cimalgex
Cimikoxyl

Odpowiedzialny standard leczenia bólu



Uspraw-
nienie
ruchowe

Usprawnienie ruchowe:

Szkolenia internetowe dla lekarzy weterynarii i zoofizjoterapeutów

Redukcja masy ciała:

Zmniejszenie obciążenia stawów



Dlaczego warto stosować Flexadin Advanced?

Nowatorskie podejście do postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów u psów

Optymalne i innowacyjne połączenie dwóch aktywnych składników:

UCII® + Boswellia serrata

Wyjatkowy profil działania, efektywności i bezpieczeństwa

- więcej korzyści dla psów i ich właścicieli

Ekonomiczne opakowania, wyjątkowa łatwość i wygoda stosowania



WIĘCEJ SPRAWNOŚCI DLA PSICH STAWÓW

NOWOŚĆ

Flexadin® Advanced



UCII® + *Boswellia serrata*

1. Ipsos study (12/2017) France 'Positioning of New Flexadin Advanced formulation' 12 vets users questioned. 2. UCII® & logo are trademarks of Lonza or its affiliates. 3. According to EU regulation, requirements for dietetic feed to support metabolism of joints in case of osteoarthritis are 3,3% DM of omega-3 fatty, 0,38% EPA and appropriate level of Vitamin E. 4. D'Altilio M., Peal A., Alvey M., Simms C., Curtsinger A., Gupta R.C., Canerdy T.D., Goad J.T., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen singly or in combination with glucosamine and chondroitin in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 17(4): 189-196. 5. Crowley D.C., Lau F.C., Sharma P., Evans M., Guthrie N., Bagchi M., Bagchi D., Dey D.K. & Raychaudhuri S.P. (2009) Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci 6(6): 312-321. 6. Bagchi D., Misner B., Bagchi M., Kothari S.C., Downs B.W., Fafard R.D. & Preuss H.G. (2002) Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 3-4: 101-110. 7. Gupta R.C., Canerdy T.D., Lindley J., Konemann M., Minniear J., Carroll B.A., Hendrick C., Goad J.T., Rohde K., Doss R., Bagchi M. & Bahchi D. (2012) Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UCII), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 96(5): 770-777. 8. Gupta R.C., Canerdy T.D., Skaggs P., Stocker A., Zyrkowski G., Burke R., Wegford K., Goad J.T., Rohde K., Barnett D., DeWees W., Bagchi M. & Bahchi D. (2009) Therapeutic efficacy of undenatured type-II collagen (UCII) in comparison to glucosamine and chondroitin in arthritic horses. J Vet Pharmacol Ther. 32(6):577-584. 9. Marone P.A., Lau F.C., Gupta R.C., Bagchi M. & Bagchi D. (2010) Safety and toxicological evaluation of undenatured type II collagen. Toxicol Mech Methods 20(4): 175-189. 10. Peal A., D'Altilio M., Simms C., Alvey M., Gupta R.C., Goad J.T., Canerdy T.D., Bagchi M. & Bagchi D. (2007) Therapeutic efficacy and safety of undenatured type II collagen (UCII) alone or in combination with (-) - hydroxycitric acid and chromate in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Ther. 30(3): 275-278. 11. Fan AY, Lao L, Zhang RX, Wang LB, Lee DY, Ma ZZ et al Effects of an acetone extract of Boswellia carterii Birdw. (Burseraceae) gum resin on rats with persistent inflammation. J Altern Complement Med 2005 11:323-331. 12. Singh GB, Atal CH Pharmacology of an extract of salai guggal ex Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions 1986 18:407-412. 13. Panéllis (06/2018) France 'Palatability study on dogs from the first stage of OA. 14. Reichling, Schmökel, Fitz, Bucher, Saller, Band 146, Heft 2, Februar 2004, 71-79 Schweiz. Arch. Tierheilk. ©Verlag Hans Huber, Bern 2004.

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego: Cimalgex 8 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów, Cimalgex 30 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów, Cimalgex 80 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Substancja czynna: Cimalgex 8 mg cimikoksylb 8 mg, Cimalgex 30 mg cimikoksylb 30 mg, Cimalgex 80 mg cimikoksylb 80 mg. Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Cimalgex 8 mg, tabletki: podługne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 1 linią podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić na dwie równe części. Cimalgex 30 mg, tabletki: podługne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 2 liniami podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić na trzy równe części. Cimalgex 80 mg, tabletki: podługne, białe do jasnobrązowych, tabletki do rozgryzania i żucia z 3 liniami podziału na obu stronach. Tabletki można podzielić na cztery równe części. Docelowe gatunki zwierząt Psy. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt: Leczenie bólu i zapalenia związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zwalczanie bólu okołoperacyjnego po zabiegach chirurgicznych ortopedycznych oraz tkanek miękkich u psów. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów w wieku poniżej 10 tygodni. Nie stosować u psów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi lub ze schorzeniami krwotocznymi. Nie stosować wraz z kortykosteroidami i innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Patrz także punkt 4.8. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na cimikoksylb lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt w okresie krycia, w ciąży i w laktacji. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania: Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt. Bezpieczeństwo produktu leczniczego nie zostało wystarczająco wykazane u młodych zwierząt, dlatego zaleca się dokładne monitorowanie podczas leczenia młodych psów w wieku poniżej 6 miesięcy. Może istnieć zwiększony ryzyko w przypadku zastosowania u zwierząt z zaburzeniami funkcji serca, nerek lub wątroby. Jeśli takie stosowanie jest konieczne, wówczas zwierzęta powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Unikać stosowania niniejszego produktu u zwierząt odwodnionych, hipowolemicznych lub z obniżonym ciśnieniem krwi, bowiem może to zwiększać ryzyko toksycznego działania na nerki. W przypadku ryzyka owróżnienia przewodu pokarmowego lub występujących uprzednio objawów nietolerancji zwierzęcia na NLPZ, produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Cimikoksylb może powodować uczulenia skórne. Po podaniu należy unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) Bardzo często zgłaszano łagodne i przejściowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty i/lub biegunka). Rzadko odnotowuje się ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak krwotoki i tworzenie się wrzodów. W rzadkich sytuacjach możliwe jest odnotowanie innych działań niepożądanych, obejmujących brak apetytu lub ospałość. Bardzo rzadko odnotowywano wzrost biochemicznych parametrów nerkowych. Poza tym bardzo rzadko odnotowywano niewydolność nerek. Jak podczas każdego długoterminowego leczenia NLPZ, należy monitorować funkcje nerkowe. Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, jeśli którykolwiek z działań niepożądanych utrzymuje się po przerwaniu leczenia. Natychmiast przerwać podawanie produktu oraz zastosować odpowiednią kontrolę i/lub leczenie, jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak utrzymujące się wymioty, powtarzająca się biegunka, utajona krew w kale, gwałtowna utrata masy ciała, brak apetytu, ospałość lub pogorszenie się wskaźników biochemicznych nerek lub wątroby. Dawkowanie i droga podawania: Podanie doustne. Zalecana dawka cimikoksylbu wynosi 2 mg na kg masy ciała raz dziennie. Wybór najodpowiedniejszej wielkości tabletki lub części tabletek pozostawia się decyzji lekarza weterynarii po ocenie danego przypadku indywidualnie i uwzględnieniu istotnego ryzyka podania zbyt małej dawki lub przedawkowania. Czas leczenia: Zwalczanie bólu okołoperacyjnego po zabiegach chirurgicznych ortopedycznych oraz tkanek miękkich: jedna dawka 2 godziny przed zabiegiem, a potem 3 do 7 dni po zabiegu opierając się na ocenie lekarza prowadzącego. Leczenie bólu i zapalenia związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów: 6 miesięcy. Dłuższe leczenie wymaga regularnego monitorowania przez lekarza weterynarii. Tabletki Cimalgex mogą być podawane z karmą lub na czczo. Tabletki zawierają substancje smakowo-zapachowe i badania (na zdrowych beaglach) wykazały, że są chętnie pobierane przez większość psów. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Vetoquinol SA, Magny Vernois 70200 Lure Francja. Numer(-y) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu EU/2/10/119/001-012.

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdynskich 13/14 • 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95/728 55 00 • fax 95/735 90 43

e-mail: info.pl@vetoquinol.com • www.vetoquinol.pl

